

细胞使用说明书

➤ 订购须知：

1. 收到细胞后首先观察细胞瓶是否完好，培养液是否有漏液、浑浊等现象，若有上述现象发生请及时拨打电话或邮箱联系；

注：观察细胞最好在低倍镜下观察，便于整体估计细胞密度；

2. 仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如细胞形态、所用培养基、血清比例、所需细胞因子等；

3. 本库细胞在培养过程不加抗生素，请客户收到细胞后根据需要自行添加双抗（青霉素和链霉素）；

4. 请用相同条件的培养基用于细胞培养。培养瓶内多余的培养基可收集备用，细胞传代时可以一定比例和客户自备的培养基混合，使细胞逐渐适应培养条件；

5. 本实验室默认 T25 瓶复苏的存活细胞常温发货，有些贴壁细胞在快递运送过程中会因振动脱落，可离心吹打后重新种入瓶中培养；

6. 建议客户收到细胞后，留存一张培养瓶外观照片以及收到的细胞前 3 天各拍几张细胞照片，记录细胞状态，便于和技术部沟通交流；

7. 细胞培养过程外因太多，我们的售后保障期为一周，具体处理原则参见售后流程图（www.dauzell.cn）或咨询当地销售人员和经销商，但不提供免费更换服务。

➤ 注意事项：

1. 所有动物细胞均视为有潜在的生物危害性，须在二级生物安全台内操作，并请注意防护，所有废液及接触过此细胞的器皿需要灭菌后方能丢弃。

2. 产品使用：本产品仅能用于科研。本产品未通过直接用于活体动物和人的审核。本产品未通过用于活体诊断的审核。



➤ 细胞信息

货号	CELL-C0037
细胞名称	BNL CL.2 小鼠胚胎肝细胞
物种	小鼠
年龄	胚胎
组织来源	肝
生物安全等级	BSL-1
生长状态	贴壁生长
细胞形态	成纤维细胞样
致瘤性	Yes, forms tumors in nude mice.
培养条件	
生长培养基: DMEM (Daucell, 货号 DCM0003) 培养基 FBS (Daucell, 货号 DCF8001) : 10% 培养条件: 37℃, CO2: 5%	
传代方法	
➤ 收到细胞后, 在倒置显微镜下观察细胞生长状态: 1) 如果没长满, 将培养瓶用 75%酒精消毒后放在培养箱静置数小时 (4h 左右), 稳定细胞状态, 静置后镜检, 拍照, 记录细胞状态。建议传代后也拍照记录细胞生长情况。 2) 如果细胞已经长满 (约 80%-90%) 则传代后继续培养。	
➤ 贴壁细胞传代方法: 1) 弃去培养基, 用不含钙、镁离子的 PBS 洗 1-2 次; 2) 加 1ml 0.25%的胰酶, 让胰酶与大部分细胞接触后置于室温, 随时观察细胞状态变化, 待细胞大部分变圆后加完全培养基终止消化。	
➤ 悬浮细胞传代方法: 可以直接传代也可以离心法传代。 1) 直接传代是让悬浮细胞慢慢沉淀在瓶底后, 将上清吸掉 1/2-2/3, 吹打细胞形成细胞悬液后, 分别接种到其他培养皿或培养瓶中继续培养; 2) 离心法传代是将细胞连同培养液一并转移到离心管内, 1000rpm, 5 分钟, 去除上清, 加新的培养液到离心管内, 吹打细胞形成细胞悬液后, 分别接种到其他培养皿或培养瓶中继续培养。 注: 收到细胞后第一次传代建议 T25 培养瓶 1:2 传代。	
冻存方法	
➤ 90%FBS, 10%DMSO, 现用现配。 ➤ 储存: 液氮中长期保存。	

For research use only, not for use in diagnostic procedures.

Web: www.daucell.cn

Customer Support: 027-87735083

E-mail: Techsupport@daucell.cn



参考文献

Patek PQ, et al. Transformed cell lines susceptible or resistant to in vivo surveillance against tumorigenesis. Nature 276: 510-511, 1978. PubMed: 723934

➤ 服务与支持:

1. 如果您有任何问题, 请随时与我们联系。
2. 微信扫描下方二维码获取表格, 详细填写表格发送至 Techsupport@daucell.cn, 技术部将会尽快处理解决。谢谢!



Scan the QR code to get Technical *Suppoprt* Request Form.

For research use only, not for use in diagnostic procedures.

Web: www.daucell.cn

Customer Support: 027-87735083

E-mail: Techsupport@daucell.cn